

1.1.8. Penil Protez Çıkarılması İşlemi

a. İşlem Bilgilendirme Metni

Bu kılavuz genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve bireysel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Tüm sorularınız ve endişeleriniz için doktorunuzla iletişime geçiniz.

İŞLEM NEDİR?

Penil protez çıkarılması, penis içine yerleştirilmiş olan bir penil protezin cerrahi olarak çıkarılması işlemini ifade eder. Enfeksiyon, protez arızası, ağrı ve diğer medikal nedenlerden dolayı penil protezin çıkarılması gerekebilir. Amaç, hastanın yaşadığı sorunları çözmek ve mevcut komplikasyonları yönetmektir.

Penil protez çıkarılması işlemi, daha önce penise yerleştirilmiş olan protezin enfeksiyon, mekanik arıza, hasta memnuniyetsizliği, ağrı veya vücut tarafından reddedilmesi gibi nedenlerle çıkarılması amacıyla yapılan bir cerrahi müdahaledir. Bu işlem, genellikle tedavi edici değil, mevcut bir sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir.

Bu işlem sonrası:

- Ciddi enfeksiyon durumlarında dokuların iyileşmesi için protez tamamen çıkarılabilir ve yeni protez daha sonra yerleştirilir.
- Bazı durumlarda aynı seansta yeni bir protez takılması da mümkün olabilir (eş zamanlı revizyon).
- Nadiren de olsa, protez çıkarıldıktan sonra peniste kılma, şekil bozukluğu, sertleşme sorunlarının şiddetinde artış gibi komplikasyonlar görülebilir.

Bu cerrahinin başarısı, altta yatan probleme, dokuların durumuna ve zamanlamaya bağlıdır. Protez çıkarılması sonrası tekrar protez takılmasının mümkün olup olmayacağına hekim muayenesi ve cerrahi bulgular doğrultusunda karar verilir.

CERRAHİ HAZIRLIĞI

Tıbbi Öykü: Ameliyat öncesi yapılacak olan muayeneniz sırasında, hekiminiz tıbbi öykünüz ile ilgili önemli sorular soracak olup, tüm bu soru ve yanıtlar, yasal olarak gizli kalmak zorundadır. Tarafınıza sorulması olası sorular aşağıdaki gibidir:

- Şeker hastalığı, yüksek kan basıncı ya da kalp hastalığı gibi herhangi bir sağlık sorununuz var mı?
- Daha önceden geçirdiğiniz idrar yolları ile ilgili bir hastalık ya da ameliyat var mı?

- Ağrı kesici, kan sulandırıcı ve benzeri sürekli olarak kullandığınız bir ilaç var mı?
- Alkol, sigara ya da uyuşturucu alışkanlığınız var mı?
- Bildiğiniz bir alerjiniz var mı?
- Genel sağlık durumunuz nasıl?
- Yakın zamanda ateş, döküntü ya da soğuk algınlığı geçirdiniz mi?

Cerrahi planlaması: Tarafınıza uygulanacak olan “Penil protez çıkarılması” cerrahi işleminin, planlandığı gibi devam edebilmesi amacı ile aşağıda sıralanmış başlıkları dikkate almanız gerekmektedir:

- 1) Sigara kullanıyor iseniz cerrahiden asgari iki hafta önce sigara kullanımını azaltın ya da tercihan tamamen bırakın.
- 2) Şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, kalp hastalığı, solunum yolları hastalığı gibi hastalıklar nedeniyle ilaç(lar) kullanıyorsanız; ilaç alımı ve dozları konusunda hekiminize danışınız.
- 3) Kan sulandırıcı ilaçların, cerrahi öncesi genellikle 5-7 gün önce tamamen kesilmesi gerektiğinden; bu grup ilaçları kullanıyor iseniz mutlaka hekiminizi bilgilendiriniz.
- 4) Planlanan cerrahiden kısa süre önce ateş, döküntü ve soğuk algınlığı benzeri şikayeti bulunan hastaların, hekimlerini bilgilendirmesi son derece önemlidir. Bu tarz şikayetlerin varlığında, cerrahi işlem genellikle ileri bir tarihe ertelenecektir.
- 5) Penil protez çıkarılması cerrahi tedavisi sonrası hastaneden evinize transferinizi sağlayacak araç planlaması yapmalısınız.
- 6) Penil protez çıkarılması açık cerrahi tedavisi sonrası hastanın birkaç gün evde istirahat etmesi, kendisine önerilen ilaçları kullanması ve sonrasında cerrahiyi uygulayan hekim tarafından kontrolü gerekmektedir.
- 7) Evinize ulaştıktan sonra size, asgari 24 saat eşlik edecek erişkin bir bireyin yanınızda bulunmasını sağlayın.
- 8) Hastaneye gelirken yanınızda küçük çocukların getirilmemesine özen gösteriniz.

CERRAHİ GÜNÜ

Evde Hazırlık:

- Cerrahi öncesi asgari 6 saatlik bir süreçte hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir.
- Cerrahisi öğleden sonra olacak hastalar sabah erken az miktarda sıvı alarak hafif kahvaltı yapabilir (Bir bardak şekerli çay ya da süt vb.)
- Cerrahiden bir gece öncesi ya da cerrahi sabahında hastaların banyo yapması önerilir.
- Cerrahi alanda yer alan saç ve kılların temizliği evde yapılmamalıdır.
- Hastaneye gelirken bol elbiselerin giyilmesi tercih edilmelidir.
- Gözlük, takı ve değerli eşyaların, hastaneye gelirken evde bırakılması önerilir
- Hekiminiz tarafında önerilmiş ise; sürekli kullandığınız şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, kalp hastalığı, kolesterol düşürücü vb. ilaçlarınızı evde az miktarda su ile alınız.

Yanınızda getirilecekler: Aşağıda belirtilenleri hastaneye beraberinizde getirmeniz gerekmektedir:

- Kimlik kartı, sigorta kartı ve mevcut ilaç reçeteleriniz
- Kullanmış olduğunuz tüm ilaçlar
- Yanınızda bulundurmanız gereken asgari miktarda para ya da kredi kartı
- Cerrahi sonrası kullanabilecek iseniz; saç fırçası, diş fırçası ve kişisel temizlik ile ilgili malzemeler
- Baston, yürüme cihazı vb. kişisel yardım cihazları
- Tüm özel eşyalarınızı içine koyabileceğiniz üzerinde adınız yazılı bir adet çanta ya da valiz
- Uygulanacak cerrahi ile ilgili tarafınıza okumanız ve onaylamanız için verilmiş olan “Penil Protez Çıkarılması için AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM BELGESİ” ameliyattan 24 saat önce mutlaka imzalanmalıdır.

Hastane Giriş İşlemleri:

Hastaneye gelir gelmez, hasta yatış işlemlerinin yapıldığı birime başvurunuz. Bu birimde tarafınıza sorulacak olası soru ve istenecekler aşağıdaki gibidir:

- Adres ve telefon bilgileri
- Kimlik ve sigorta kartı
- Hastaneye yatışınız ile ilgili, kanuni olarak onaylamak zorunda olduğunuz evrakları okuyup imzalamanız istenecektir.

Giriş işlemleriniz sonrası görevli personel eşliğinde ilgili cerrahi servise yönlendirileceksiniz. Servise varışınız ile birlikte tarafınıza aşağıdaki işlemler uygulanacaktır.

- Sistemik kan basıncı, nabız ve vücut ısısı ölçümü
- Cerrahi enfeksiyon riskinin azaltılması amacı ile, cerrahi alanda yer alan saç ve kılların kesilmesi (Ameliyat odasında da yapılabilir)
- Cerrahi öncesi, sırasında ve sonrasında gerekli ilaç ve sıvı solüsyonların tarafınıza verilebilmesi amacı ile damar yolu açılması
- Cerrahi işlem sırasında uygulanacak olan anestezi tipi ile ilgili olarak, uzman bir hekim tarafından bilgilendirilecek ve hangi anestezi tipini seçtiğiniz kayıt edilecektir

Tüm bu işlemler sırasında refakatçiniz yanınızda bulunabilir. Bununla birlikte cerrahi odasına girişiniz ile birlikte; sorumlu cerrahi personel dışında hiç kimsenin ameliyathane bölümüne girmesine izin verilmeyecektir.

ANESTEZİ İŞLEMİ

Anestezi işlemi; tarafınıza uygulanacak olan cerrahi işlem sırasında herhangi bir ağrı duymadan, ameliyatınızın baştan sona konforlu bir şekilde devamını sağlayan uygulamadır. Bu işlem ‘Anesteziyoloji ve Reanimasyon’ hekimlerinin kontrolünde değişik şekillerde uygulanabilmektedir. İyi huylu prostat büyümesi cerrahi tedavisi, aşağıda sıralanmış anestezi seçeneklerinden herhangi birinin yardımı ile uygulanabilir:

- Genel anestezi: Bu işlemde hastalar tam bir uyku halinde olup; hiçbir şekilde uygulanan cerrahi ile ilişkili bir uyararı hissetmezler. İşlem sırasında hastaların hayati fonksiyonları uzman hekimlerce yakından takip edilir.
- Spinal anestezi: Spinal anestezi uygulanan hastalar bel bölgesinin altında kalan vücut bölgelerinin hissini geçici olarak kaybeder ve yine bu bölgede yer alan, bacak gibi uzuvlarının hareket yeteneğini yine geçici olarak kaybederler.
- Epidural anestezi: Spinal anestezi işlemine benzer şekilde, omurilik kanalı dışına yerleştirilen bir kateterden verilen lokal anestezi maddeleri yardımıyla, bölgesel anestezi gelişmesi sağlanır.

Cerrahi işlem sırasında hangi tip anestezinin uygulanacağı; genellikle hasta, anesteziyoloji uzmanı ve ameliyatı yapacak olan hekimin tercihi ile tıbbi gereksinimler göz önüne alınarak; ameliyat ekibi tarafından kararlaştırılır.

AMELİYAT İŞLEMİ

Ameliyat işlemi, ameliyatın güvenli ve daha önemlisi steril şartlar altında gerçekleştirilebileceği, bilimsel standartlara uygun ameliyathanelerde yapılır. Ameliyathanelerde, ameliyatı gerçekleştirecek ekip dışında, ameliyathane hemşire ve teknisyenleri de yer almaktadır. Sözü edilen ekibin görevi; ameliyatın başından sonuna kadar güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak ve işlem sırasında hayati fonksiyonlarınızı yakından takip ederek, gerekli anlarda zorunlu tıbbi müdahaleleri yapmaktır.

Ameliyat sırasında genel anestezinin uygulandığı olgularda; soluk borusuna yerleştirilen bir tüp sayesinde bir yandan solunumunuz yapay olarak sağlanırken, öte yandan da uykunuzun devamını sağlayan anestezi gazlarının akciğerlerinize gönderilmesi sağlanır. Bu işlem sırasında sistemik kan basıncı, kalp atımı ve ritmi, kan gazı ölçümü gibi yaşamsal fonksiyonların takibi de monitörler yardımıyla yapılır.

İşlemin Aşamaları:

a. Hazırlık:

- **Değerlendirme:** Protez çıkarılması öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılır. Tıbbi geçmişiniz ve mevcut sağlık durumunuz gözden geçirilir.
- **Anestezi:** İşlem sırasında rahat olmanız için genel anestezi veya lokal anestezi uygulanabilir.

b. İşlem:

- **Cerrahi Müdahale:** Protez çıkarılması, genellikle kasık veya skrotum bölgesinden yapılır. Doktorunuz, protezi dikkatlice çıkararak bölgedeki herhangi bir enfeksiyon, hasar veya komplikasyonu kontrol eder.
- **Temizlik ve Kontrol:** Protez çıkarıldıktan sonra, bölge temizlenir ve mevcut enfeksiyon veya diğer sorunlar değerlendirilir.

c. İşlem Sonrası:

- **İyileşme:** İşlem sonrası genellikle hastanede kısa süreli gözlem ve iyileşme süreci gerekebilir. Çoğu hasta, operasyon sonrası kısa sürede günlük aktivitelerine dönebilir.
- **Takip:** İyileşme süreci ve komplikasyon riski açısından düzenli takipler yapılır.

Cerrahi işlem sonrası, uygulanan anestezinin etkisi geçinceye ve bilinciniz tam olarak açılıncaya kadar; ameliyat sonrası takip ünitesinde yine uzman kişiler tarafından takibiniz yapılacaktır. Uzman kişiler, anestezi etkisinin tamamen kaybolduğuna inandıktan sonra, hasta odanıza dönmeniz sağlanacaktır. Uyanma sırasında genellikle normalde duymaya alışkın olduğunuz tüm sesleri; olduğundan daha gürültülü olarak duymanız mümkündür. Genellikle cerrahi ile ilgili hiçbir şey hatırlamamak ve bulanık görmenin olması sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Genel anestezi uygulamaları sonrası boğazda kuruluk hissi ve cerrahinin uygulandığı bölgede ağrı sıklıkla görülen şikayetlerdir.

UYANMA SONRASI AĞRI TEDAVİSİ

Her türlü ağrının hekiminize olabildiğince açık ve net olarak bildirilmesi son derece önemlidir. Ameliyat sonrası karşılaşılan ağrıların, ameliyat ile ilişkili geçici ağrılar olabileceği gibi ameliyat sonrası gelişen bir komplikasyon ile de ilişkili olabileceği unutulmamalı ve ameliyatı yapan hekime mutlaka bildirilmelidir. Ağrı kontrolü amacı ile gerekli ilaç tedavisi hekiminiz tarafınızdan yerine getirilecektir. İlaç tedavisinde önemli olan noktalar aşağıdaki gibidir:

- Hekim tarafından önerilen ilacı kullanınız
- Önerilen ilacı yatağınızdan kalkmadan ya da yürümeye başlamadan 30-40 dakika önce alınız
- İlaç yan etkisi konusunda bilgi alınız
- İlacın etkisiz kaldığı durumlarda hekiminize bilgi veriniz
- Genellikle ağrı kesici ilaçlar ağrınızı önemli derecede hafifletir ancak tamamen ortadan kaldırmayabilir
- Bu tarz ilaçların bağımlılık yapıcı etkisi genellikle nadirdir

OLASI RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR

a. Genel Riskler:

- **Ağrı ve Rahatsızlık:** İşlem sonrası ağrı veya rahatsızlık hissi olabilir.
- **Şişlik ve Morarma:** Operasyon bölgesinde şişlik veya morarma görülebilir.
- **Enfeksiyon:** Cerrahi bölgede enfeksiyon riski vardır.

b. Tedaviye Özgü Riskler:

- **Kanama:** İşlem sırasında veya sonrasında kanama meydana gelebilir.
- **Yaraların İyileşme Sorunları:** Operasyon bölgesinde iyileşme problemleri yaşanabilir.
- **Eretil Fonksiyon:** Protezin çıkarılması erektile fonksiyon üzerinde etkili olabilir ve cinsel işlevde değişiklikler görülebilir.
- **Doku Hasarı:** Protezin çıkarılması sırasında peniste doku hasarı oluşabilir.

c. Diğer Olası Komplikasyonlar:

- **Psikolojik Etkiler:** Cinsel işlevde değişiklikler veya protezin işlevsizliği psikolojik etkilere yol açabilir.
- **Yeniden Protez Gereksinimi:** Protez çıkarıldıktan sonra, gerekirse yeni bir protez yerleştirilmesi gibi ek cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir.

PENİL PROTEZ ÇIKARILMASI İŞLEMİ AMELİYATI SONRASI GENEL UYGULAMALAR

- Yaşlı hastalarda öksürme ve soluk alıp verme egzersizleri genellikle zatürre gelişimini engellemek amacı ile hastalardan yapmaları istenen bir uygulamadır. Bu amaçla hastalardan; solunum fonksiyon testlerinin uygulanmasında kullanılan cihazlar yardımıyla derin nefes alıp vermeleri istenebilir.
- Ameliyat sonrası hastaların bacaklarını değişik derece ve yönlerde hareket ettirmeleri ya da belirli sürelerde hasta odası içinde ya da kat koridorunda dolaşmaları sağlanır. Bu egzersizler ameliyat sonrası bacaklarda yavaşlamış olan kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.
- Ameliyat sonrası gerekli egzersizlerin yapılabilmesi için öncelikle ameliyat ile ilişkili ağrılarınızın olabildiğince azaltılması önemlidir. Bu amaçla, hekiminizi ağrılarınız konusunda bilgilendirip, ağrıya yönelik tedavi talep etmeniz önemlidir.

PENİL PROTEZ ÇIKARILMASI İŞLEMİ AMELİYATI SONRASI BAKIM

Ameliyat Sonrası İlk Günler

- **Dinlenme:** Ameliyat sonrası ilk birkaç gün boyunca dinlenmek çok önemlidir. Bu süre zarfında ağır kaldırmaktan, zorlayıcı egzersizlerden ve ani hareketlerden kaçınmalısınız. Vücudunuzun iyileşmesi için yeterince dinlenmeye özen gösterin.
- **Ağrı Yönetimi:** Ameliyat sonrası bölgede hafif ila orta şiddette ağrı olabilir. Doktorunuzun reçete ettiği ağrı kesicileri belirtilen dozlarda ve zamanlarda kullanın. Şiddetli ağrı, şişlik ya da herhangi bir anormal durum fark ederseniz, hemen doktorunuza başvurun.
- **Yara Bakımı:**
- **Hijyen:** Ameliyat bölgesinin temizliği enfeksiyonu önlemek için kritik öneme sahiptir. Cerrahi bölgeyi nazıkçe yıkayın ve tamamen kuru olduğundan emin olun. Pansuman yapmanız gerekiyorsa, doktorunuzun önerdiği şekilde ve sıklıkta pansumanları değiştirin. Ellerinizi pansuman öncesi mutlaka sabunlu suyla yıkayın.
- **Kontroller:** Yarada kızarıklık, şişlik, sıcaklık artışı, kötü kokulu akıntı gibi enfeksiyon belirtileri olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Bu belirtilerden herhangi biri oluşursa, vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun.
- **İdrar Takibi:** Penil protez çıkarılması sonrası idrar yaparken yanma, rahatsızlık ya da zorlanma hissedebilirsiniz. Bu tür belirtiler yaygın olabilir ancak devam etmesi durumunda doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Ayrıca, idrar renginde belirgin bir değişiklik ya da idrarda kan fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin.

Fiziksel Aktivite

- **Yürüme:** Ameliyat sonrası ilk birkaç gün içinde doktorunuzun onayı ile hafif yürüyüşler yapmaya başlayabilirsiniz. Bu, kan dolaşımınızı artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Ancak aşırıya kaçmamak ve kendinizi zorlamamak önemlidir.

- **Egzersiz ve Cinsel Aktivite:** Ameliyat sonrası ilk 4-6 hafta boyunca ağır fiziksel aktivitelerden ve cinsel ilişkiden kaçınmalısınız. Doktorunuz, ne zaman normal aktivitelere dönebileceğinizi size bildirecektir.

Beslenme ve Sıvı Alımı

- **Dengeli Beslenme:** Ameliyat sonrası iyileşme sürecini desteklemek için dengeli bir diyet uygulayın. Yeterli protein, vitamin ve mineral alımına özen gösterin.
- **Sıvı Alımı:** Yeterli sıvı almak, vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olur. Günde en az 1.5-2 litre su tüketmeye özen gösterin. Bu, idrar yollarınızın temizlenmesine ve idrar yaparken oluşabilecek rahatsızlıkların azalmasına da yardımcı olabilir.

Takip ve Kontroller

- **Takip Randevuları:** Ameliyat sonrası iyileşme sürecinizin izlenmesi ve komplikasyonların önlenmesi için doktorunuzla planlanan takip randevularına düzenli olarak gitmelisiniz. Bu ziyaretler sırasında doktorunuz, yaranın iyileşme durumunu kontrol edecek ve gerekirse ek tedaviler önerecektir.
- **Psikolojik Destek:** Penil protez çıkarılması ameliyatı, duygusal ve psikolojik etkiler yaratabilir. Bu süreçte, yaşadığınız duygusal zorlukları doktorunuzla paylaşmaktan çekinmeyin. Gerekli durumlarda psikolojik destek almayı değerlendirebilirsiniz.


EVİNİZE GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Hastaneden ayrıldıktan sonra yapmanız ve dikkat etmeniz gereken başlıklar ile ilgili olarak hekiminiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Ek olarak, merak edip sormak istediğiniz her türlü konu ile ilgili hekiminize danışabilirsiniz. Hastaneden ayrılmadan önce hekiminiz tarafından yapılan bilgilendirme sırasında erişkin bir yakınınızın yanınızda olması; özellikle unutabileceğiniz bazı önemli konuların hatırlanması açısından faydalı olabilir. Genellikle sorulması gereken ve hekimlerin bilgilendirme yaptıkları başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Ameliyat sonrası banyo zamanı
- Yiyecek ve içecek kısıtlamaları
- Araç sürmeye başlama zamanı
- Yara bakımı
- Kullanılacak ilaçlar ve ağrı kontrolü
- Rutin fiziksel aktiviteye başlama zamanı ve belli sürelerle yapılmaması gereken aktiviteler
- Cinsel yaşamın ne zaman başlayacağı
- İşe dönme zamanı
- Ameliyat sonrası ilk kontrol randevu tarihi

Sağlıklı ve hızlı bir iyileşme süreci geçirmeniz dileğiyle!

b. Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi



Sayın Hasta/Hasta Yakını,

Bu belgeyi lütfen dikkatlice okuyunuz. Bu onam formu önerilen tıbbi tanı/tedaviye yönelik işlem hakkında sizi ayrıntılı olarak bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anlamadığınız noktaları doktorunuza sorabilirsiniz. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu size ait olacak şekilde uygulanması planlanan bu işlemi **reddedebilir veya rızanızı geri çekebilirsiniz**. Bu durumda tetkik ve tedaviyi reddetme formunu doldurmanız gerekmektedir.

1. İşlemin Tanımı ve Amacı

Penil protez çıkarılması, penis içine yerleştirilmiş olan bir penil protezin cerrahi olarak çıkarılması işlemi ifade eder. Bu işlem, çeşitli nedenlerle penil protezinin çıkarılmasını gerektirebilir, örneğin enfeksiyon, protez arızası, ağrı veya başka medikal komplikasyonlar. Amaç, hastanın yaşadığı sorunları çözmek veya mevcut komplikasyonları yönetmektir.

Penil protez çıkarılması şu durumlarda önerilebilir:

- **Enfeksiyon:** Protez çevresinde enfeksiyon gelişmesi durumunda.
- **Protezin Arızası:** Protez işlevsiz hale geldiğinde veya mekanik sorunlar yaşandığında.
- **Ağrı ve Rahatsızlık:** Protezin neden olduğu sürekli ağrı veya rahatsızlık durumlarında.
- **Yetersiz Sonuç:** Protezin beklenen derecede etkin olmadığı veya erektil fonksiyonun yeterince iyileşmediği durumlarda.
- **Medikal Komplikasyonlar:** Protezin neden olduğu diğer medikal sorunlar veya komplikasyonlar.

Penil protez çıkarılması işlemi, daha önce penise yerleştirilmiş olan protezin enfeksiyon, mekanik arıza, hasta memnuniyetsizliği, ağrı veya vücut tarafından reddedilmesi gibi nedenlerle çıkarılması amacıyla yapılan bir cerrahi müdahaledir. Bu işlem, genellikle tedavi edici değil, mevcut bir sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir.

Bu işlem sonrası:

- Ciddi enfeksiyon durumlarında dokuların iyileşmesi için protez tamamen çıkarılabilir ve yeni protez daha sonra yerleştirilir.
- Bazı durumlarda aynı seansta yeni bir protez takılması da mümkün olabilir (eş zamanlı revizyon).
- Nadiren de olsa, protez çıkarıldıktan sonra peniste kısılma, şekil bozukluğu, sertleşme sorunlarının şiddetinde artış gibi komplikasyonlar görülebilir.

Bu cerrahinin başarısı, altta yatan probleme, dokuların durumuna ve zamanlamaya bağlıdır. Protez çıkarılması sonrası tekrar protez takılmasının mümkün olup olmayacağına hekim muayenesi ve cerrahi bulgular doğrultusunda karar verilir.

2. İşlemin Uygulanma Süreci

a. Hazırlık:

- **Değerlendirme:** Protez çıkarılması öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılır. Tıbbi geçmişiniz ve mevcut sağlık durumunuz gözden geçirilir.
- **Anestezi:** İşlem sırasında rahat olmanız için genel anestezi veya lokal anestezi uygulanabilir.

b. İşlem:

- **Cerrahi Müdahale:** Protez çıkarılması, genellikle kasık veya skrotum bölgesinden yapılır. Doktorunuz, protezi dikkatlice çıkararak bölgedeki herhangi bir enfeksiyon, hasar veya komplikasyonu kontrol eder.
- **Temizlik ve Kontrol:** Protez çıkarıldıktan sonra, bölge temizlenir ve mevcut enfeksiyon veya diğer sorunlar değerlendirilir.

c. İşlem Sonrası:

- **İyileşme:** İşlem sonrası genellikle hastanede kısa süreli gözlem ve iyileşme süreci gerekebilir. Çoğu hasta, operasyon sonrası kısa sürede günlük aktivitelerine dönebilir.
- **Takip:** İyileşme süreci ve komplikasyon riski açısından düzenli takipler yapılır.

3. Olası Riskler ve Komplikasyonlar

a. Genel Riskler:

- **Ağrı ve Rahatsızlık:** İşlem sonrası ağrı veya rahatsızlık hissi olabilir.
- **Şişlik ve Morarma:** Operasyon bölgesinde şişlik veya morarma görülebilir.
- **Enfeksiyon:** Cerrahi bölgede enfeksiyon riski vardır.

b. Tedaviye Özgü Riskler:

- **Kanama:** İşlem sırasında veya sonrasında kanama meydana gelebilir.
- **Yaraların İyileşme Sorunları:** Operasyon bölgesinde iyileşme problemleri yaşanabilir.
- **Eretil Fonksiyon:** Protezin çıkarılması eretil fonksiyon üzerinde etkili olabilir ve cinsel işlevde değişiklikler görülebilir.
- **Doku Hasarı:** Protezin çıkarılması sırasında peniste doku hasarı oluşabilir.

c. Diğer Olası Komplikasyonlar:

- **Psikolojik Etkiler:** Cinsel işlevde değişiklikler veya protezin işlevsizliği psikolojik etkilere yol açabilir.
- **Yeniden Protez Gereksinimi:** Protez çıkarıldıktan sonra, gerekirse yeni bir protez yerleştirilmesi gibi ek cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir.

4. İşlemin Alternatifleri:

Penil protez çıkarılması için alternatif yöntemler şunları içerebilir:

- Antibiyotik Tedavisi: Enfeksiyon durumunda antibiyotik tedavisi.
- Protezin Onarımı veya Değiştirilmesi: Protezin işlevselliğini artırmak için onarım veya değişim önerilebilir.
- Diğer Eretil Disfonksiyon Tedavi Yöntemleri: Oral ilaçlar, vakum cihazları, PRP tedavisi veya diğer medikal ve cerrahi yöntemler.

Bu Tedavi Uygulanmazsa Neler Gelişir?

Eğer penil protez çıkarılması işlemi gerçekleştirilmezse, mevcut durum devam edebilir ve aşağıdaki sonuçlar yaşanabilir:

- **Enfeksiyonun Yayılması:** Enfeksiyon veya komplikasyonlar devam edebilir ve yayılabilir.
- **Ağrı ve Rahatsızlığın Sürekliliği:** Protez kaynaklı ağrı ve rahatsızlık devam edebilir.
- **Eretil Fonksiyon Problemleri:** Mevcut protez ile ilgili sorunlar devam edebilir ve cinsel işlevde daha fazla bozulma yaşanabilir.
- **Ek Cerrahi Müdahale Gereksinimi:** Diğer cerrahi müdahalelere veya tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Bu Bölüm İlgili Hekim Tarafından Doldurulacaktır.

Bu belgede yazılı olan konuları hastanın/hasta yakınının anlayacağı dilde anlattım. İşlemin risk ve komplikasyonlarından bahsettim.

Hekim Ad-Soyad-Ünvan	Tarih-Saat	İmza
----------------------	------------	------

Bu Bölüm Hasta/Yakını Tarafından Doldurulacaktır.

Yukarıda açıklamaları okudum ve/veya bana anlatıldı. Yapılacak Penil Protez Çıkarılması İşlemi hakkında bana gerekli bilgi verildi. Seçenekler anlatıldı. Sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlar doktorum tarafından tamamen açıklandı.

Bana uygulanacak işlemin yapılmasına izin veriyorum.

Lütfen aşağıdaki kutu içine kendi el yazınızla

**“OKUDUM, ANLADIM VE ONAY VERİYORUM.
BU BELGENİN BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM”** yazınız.

--

Hasta/Yakını Ad-Soyad	Tarih-Saat	İmza
(Yakınlık Derecesi)		

Bu belge, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hazırlanmıştır. Belgede belirtilen bilgiler hastanın ve hasta yakınlarının anlayacağı şekilde sunulmuştur. Herhangi bir hukuki ihtilaf durumunda, Türk Hukuku uygulanacaktır.

NOT: Bu form iki nüsha düzenlenir ve bir nüshası hastaya/hasta yakınına verilir.